

葡萄

丈夫ですか？

例年、有毒きのこによる**食中毒**が発生しています

わからないうももの  
来ひなう  
食ひなう  
長ひなう  
おひなう

誤った言い伝えや迷信を信じず、食べられるもののこの特徴を完全に覚えましょう！  
毎年採って食べているものでも、同じ時期や場所に、類似した毒きのこが生えている場合があるので、もう一度よく確認しましょう。

フチウブン

カキシメシ

シキョタク

クサクラ  
ベニタケの  
特徴

- ① 傘の裏側(ヒタ)は初め白色、ちピンク(肉)色(ウラベニです)
- ② 柄は中空でもろい
- ③ 食後30分位から激しい嘔吐、下痢
- ④ ウラベニホテイシメジとの鑑別は難しい

## カキシメジ の特徴

- ① 傘の裏側(ヒタ)は白色で、傷つけると茶褐色のシミができる
- ② 食後30分位から激しい嘔吐、下痢
- ③ チャナメツムタケ、ツツタケモドキなどと間違える

ツキヨタケ  
の特徴

- ① 枯れびにゴナの木などに群生
- ② 柄は、ヒダのつけ根との境につば(エリヤキ)様の隆起がある
- ③ 真ん中で割くと柄の断面に黒いシミがある(無いものもある)
- ④ ムキタケ、ヒラタケとの鑑別は難しい

