

その毒の大きさ大丈夫ですか？

例年、有毒きのこによる**食中毒**が発生しています

わからないきのこは採らない
採らないきのこは食べない
食べないきのこは売らない
売らないきのこは買わない

※写真はツキヨタケの群生です

誤った言い伝えや迷信を信じず、食べられるきのこの特徴を完全に覚えましょう！
毎年採って食べているきのこでも、同じ時期や場所に、類似した毒きのこが生えている場合があるので、もう1度よく確認しましょう。

食



ウラベイホテイシメジ

食



チャナメツムタケ

食



ムキヨタケ

毒

クサウラベニタケ



毒

カキシメジ



毒

ツキヨタケ



クサウラ
ベニタケの
特徴

- ① 傘の裏側(ヒタ)は初め白色、のちピンク(肉)色(ウラベニです)
- ② 柄は中空でもうい
- ③ 食後30分位から激しい嘔吐、下痢
- ④ ウラベニホテイシメジとの鑑別は難しい

カキシメジ
の特徴

- ① 傘の裏側(ヒタ)は白色で、傷つけると茶褐色のシミができる
- ② 食後30分位から激しい嘔吐、下痢
- ③ チャナメツムタケ、マツタケモドキなどと間違える

ツキヨタケ
の特徴

- ① 枯れたブナの木などに群生
- ② 柄は、ヒタのつけ根との境につば(エリマキ)様の隆起がある
- ③ 真ん中で割くと柄の断面に黒いシミがある(無いものもある)
- ④ ムキヨタケ、ヒラヨタケとの鑑別は難しい

